




БАРОН



Группа спелости	ранний
Назначение сорта	столовый
Морфологические признаки	
куст	средний
лист	средний
венчик цветка	светло-фиолетовый
Клубень	
окраска кожуры	желтая с красными глазками
окраска мякоти	желтая
форма клубня	округло-овальная
глубина глазков	средние
Структура урожая	
потенциальная урожайность, т/га	60,0
количество клубней на куст, шт.	10-15
средняя масса клубня, г	100-160
Качественные характеристики	
содержание крахмала, %	15,0-20,2
вкус, балл	4,2-4,8
разваримость	сильная (тип С)
содержание белка, %	2,56-3,43
содержание витамина С, мг%	18,4-24,0
Устойчивость к жаре и засухе	слабая
Устойчивость к болезням, вредителям	
рак картофеля	устойчив
картофельная нематода	слабовосприимчив
фитофтороз	не устойчив
парша обыкновенная	среднеустойчив
вирусные заболевания	среднеустойчив
Лежкость при хранении	средняя
Примечание	отличается ранним накоплением урожая и высокими вкусовыми качествами
Включён в Госреестр РФ	2006 г.
Регион возделывания	4, 10, 12
Наличие патента	патент




STI	STG	STI	STI	STI	STM	STM	STI	STM	STI
0032FAM	0016FAM	001FAM	0010ROX	0031ROX	0114ROX	1104R6G	004R6G	5127R6G	0014TAMRA
80-83	122-131-134-152	178	90-93-108	118-130-136	287-293-296-302	81-96	172	240	178-181-184
(1-5)	(1-1-1-1)	(4)	(2-3-1)	(2-3-1)	(1-3-1-1)	(2-2)	(4)	(4)	(1-1-2)

КАМЕНСКИЙ

9





Группа спелости	ранний
Назначение сорта	столовый
Морфологические признаки	
куст	средний
лист	средний
венчик цветка	красно-фиолетовый
Клубень	
окраска кожуры	красная
окраска мякоти	светло-желтая
форма клубня	удлиненно-овальные
глубина глазков	мелкие
Структура урожая	
потенциальная урожайность, т/га	45,0
количество клубней на куст, шт.	12-20
средняя масса клубня, г	100-140
Качественные характеристики	
содержание крахмала, %	14,2-18,6
вкус, балл	4,0-4,3
разваримость	сильная (тип В)
содержание белка, %	2,97-3,12
содержание витамина С, мг%	18,5-24,0
Устойчивость к жаре и засухе	средняя
Устойчивость к болезням, вредителям	
рак картофеля	устойчив
картофельная нематода	не устойчив
фитофтороз	не устойчив
парша обыкновенная	среднеустойчив
вирусные заболевания	среднеустойчив
Лежкость при хранении	удовлетворительная
Примечание	раннее накопление урожая, многоклубневый, имеет короткий период покоя, слабо поедается колорадским жуком
Включён в Госреестр РФ	2009 г.
Регион возделывания	4, 9, 10
Наличие патента	патент



STI 0032FAM 65-81-87-99 (1-1-1-1)	STG 0016FAM 122-128-134 (1-1-1)	STI 001FAM 178-184-190 (1-1-1)	STI 0030ROX 90-93-99 (1-1-2)	STI 0013ROX 118-124-136 (2-1-1)	STM 5114ROX 293-302-311 (1-3-1)	STM 1104R6G 93-96-99 (1-1-2)	STI 004R6G 169-172-178 (1-1-1)	STM 5127R6G 240-249-268 (1-1-3)	STI 0014TAMR 184 (4)
--	--	---	---------------------------------------	--	--	---------------------------------------	---	--	-------------------------------

ИРБИТСКИЙ N


Группа спелости	среднеранний
Назначение сорта	столовый
Морфологические признаки	
куст	высокий
лист	средний
венчик цветка	красно-фиолетовый
Клубень	
окраска кожуры	красная
окраска мякоти	светло-желтая
форма клубня	округлая
глубина глазков	мелкие
Структура урожая	
потенциальная урожайность, т/га	50
количество клубней на куст, шт.	5-10
средняя масса клубня, г	120-200
Качественные характеристики	
содержание крахмала, %	12,2-14,6
вкус, балл	4,0-4,4
разваримость	слабая (тип ВС)
содержание белка, %	2,90-3-18
содержание витамина С, мг%	16,5-23,2
Устойчивость к жаре и засухе	слабая
Устойчивость к болезням, вредителям	
рак картофеля	устойчив
картофельная нематода	устойчив
фитофтороз	среднеустойчив
парша обыкновенная	среднеустойчив
вирусные заболевания	среднеустойчив
Лежкость при хранении	хорошая
Примечание	крупноклубневый, с высокой товарностью клубней
Включён в Госреестр РФ	2012 г.
Регион возделывания	4, 10
Наличие патента	патент




STI 0032FAM 68-81-100 (2-1-1)	STG 0016FAM 122-131-134 (1-2-1)	STI 001FAM 178-184-190 (2-1-1)	STI 003ROX 98-93-99 (1-2-1)	STI 003ROX 118-136 (3-1)	STM 5114BOX 302 (4)	STM 1104RG 99-108 (2-2)	STI 004RG 172 (4)	STM 5127RG 249-268 (3-1)	STI 0014TAMRA 178 (4)
--	--	---	--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ОТРАДА N

11






Группа спелости	среднеранний
Назначение сорта	столовый
Морфологические признаки	
куст	средний
лист	средний
венчик цветка	красно-фиолетовый
Клубень	
окраска кожуры	красная
окраска мякоти	светло-желтая
форма клубня	округло-овальная
глубина глазков	мелкие
Структура урожая	
потенциальная урожайность, т/га	42
количество клубней на куст, шт.	12-25
средняя масса клубня, г	80-140
Качественные характеристики	
содержание крахмала, %	16,2-18,3
вкус, балл	4,2-4,5
разваримость	слабая (тип В)
содержание белка, %	3,12-3,81
содержание витамина С, мг%	14,8-17,6
Устойчивость к жаре и засухе	средняя
Устойчивость к болезням, вредителям	
рак картофеля	устойчив
картофельная нематода	устойчив
фитофтороз	среднеустойчив
парша обыкновенная	слабо поражается
вирусные заболевания	среднеустойчив
Лёжкость при хранении	хорошая
Примечание	многоклубневый, рекомендуется возделывать на легких и средних типах почв
Включён в Госреестр РФ	2013 г.
Регион возделывания	4
Наличие патента	патент




STI 0032FAM	STG 0016FAM	STI 001FAM	STI 0039ROX	STI 0033ROX	STM 5114ROX	STM 1104R6G	STI 004R6G	STM 5127R6G	STI 0014TAMR A
65-77-86 9 (1-1-2)	122-131- 134-151(1-1- 1-1)	178-184-190 (2-1-1)	90-86-108 (2-1-1)	118-124-136 (2-1-1)	293-302 (1- 3)	81-99-105	166-175 (2- 2)	240-268 (3- 1)	181-184 (2- 2)


Группа спелости	среднеранний
Назначение сорта	столовый
Морфологические признаки	
куст	средний
лист	средний
венчик цветка	красно-фиолетовый
Клубень	
окраска кожуры	красная
окраска мякоти	светло-желтая
форма клубня	округло-овальная
глубина глазков	мелкие
Структура урожая	
потенциальная урожайность, т/га	42
количество клубней на куст, шт.	12-25
средняя масса клубня, г	80-140
Качественные характеристики	
содержание крахмала, %	16,2-18,3
вкус, балл	4,2-4,5
разваримость	слабая (тип В)
содержание белка, %	3,12-3,81
содержание витамина С, мг%	14,8-17,6
Устойчивость к жаре и засухе	средняя
Устойчивость к болезням, вредителям	
рак картофеля	устойчив
картофельная нематода	устойчив
фитофтороз	среднеустойчив
парша обыкновенная	слабо поражается
вирусные заболевания	среднеустойчив
Лёжкость при хранении	хорошая
Примечание	многоклубневый, рекомендуется возделывать на легких и средних типах почв
Включён в Госреестр РФ	2013 г.
Регион возделывания	4
Наличие патента	патент



STI	STG	STI	STI	STI	STM	STI	STM	STI	STM
0032FAM	0016FAM	001FAM	0033ROX	0033ROX	0014ROX	0048GG	0048GG	0014TAMRA	0014TAMRA
80-83	122-131	169-178-190	90-93-96-99	130-136	302	81-99-105	131-169-178	249-268	187
(2-2)	(1-3)	(1-2-1)	(1-1-1-1)	(1-3)	(4)	(1-1-1)	(1-2-1)	(3-1)	(4)






Группа спелости	среднеранний
Назначение сорта	столовый
Морфологические признаки	
куст	высокий
лист	средний
венчик цветка	светло-фиолетовый
Клубень	
окраска кожуры	красная
окраска мякоти	светло-желтая
форма клубня	округлая
глубина глазков	мелкие
Структура урожая	
потенциальная урожайность, т/га	80,00
количество клубней на куст, шт.	16-22
средняя масса клубня, г	110-160
Качественные характеристики	
содержание крахмала, %	12-15
вкус, балл	4,0-4,5
разваримость	слабая (тип АВ)
содержание белка, %	3,00-3,12
содержание витамина С, мг%	17,6-26,4
Устойчивость к жаре и засухе	высокая
Устойчивость к болезням, вредителям	
рак картофеля	устойчив
картофельная нематода	устойчив
фитофтороз	среднеустойчив
парша обыкновенная	слабо поражается
вирусные заболевания	среднеустойчив
Лёжкость при хранении	хорошая
Примечание	сорт интенсивного типа, много-клубневый, отличается высокой урожайностью
Включён в Госреестр РФ	2015 г., совместно с ООО «Агрофирма «КРИММ»
Регион возделывания	4,10
Наличие патента	патент






STI 0032FAM 71-80 (2-2)	STG 0016FAM 131-182 (3-1)	STI 001FAM 178-190 (3-1)	STI 0030ROX 90-93-96-99 (1-1-1-1)	STI 0033ROX 118-136-135 (2-1-1)	STM 5114ROX 293-302-311 (1-2-1)	STM 1104R6G 81-99 (1-3)	STI 004R6G 169 (4)	STM 5127R6G 240-249-268 (1-2-1)	STI 0014TAMRA 175-187 (3-1)
----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	-----------------------------	--	--------------------------------------


Группа спелости	среднеранний
Назначение сорта	столовый
Морфологические признаки	
куст	высокий
лист	средний
венчик цветка	белый
Клубень	
окраска кожуры	желтая
окраска мякоти	светло-желтая
форма клубня	округлая
глубина глазков	мелкие
Структура урожая	
потенциальная урожайность, т/га	60,00
количество клубней на куст, шт.	12-18
средняя масса клубня, г	90-140
Качественные характеристики	
содержание крахмала, %	14-19
вкус, балл	4,3-4,8
разваримость	слабая (тип В)
содержание белка, %	2,56-3,43
содержание витамина С, мг%	21,6-28,2
Устойчивость к жаре и засухе	средняя
Устойчивость к болезням, вредителям	
рак картофеля	устойчив
картофельная нематода	устойчив
фитофтороз	устойчив
парша обыкновенная	высокоустойчив
вирусные заболевания	среднеустойчив
Лежкость при хранении	хорошая
Примечание	рекомендуется возделывать на легких и средних типах почв, пластичен
Включён в Госреестр РФ	2015 г.
Регион возделывания	4,9
Наличие патента	патент



STI 0032FAM 71-80-43 (1-1-2)	STG 0016FAM 128-131-134-152 (1-1-1-1)	STI 0016FAM 166-175-178-190 (1-1-1-1)	STI 0038FAM 99-99-105 (2-1-1)	STI 0038FAM 118-136-139 (2-1-1)	STM 0148FAM 293-302 (2-2)	STM 0048FAM 81-105 (1-3)	STI 0048FAM 169 (4)	STM 0127FAM 249 (4)	STI 0014FAM 184 (4)
---------------------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------







Группа спелости	ранний
Назначение сорта	столовый
Морфологические признаки	
куст	низкий
лист	средний
венчик цветка	светло-фиолетовый
Клубень	
окраска кожуры	красная
окраска мякоти	светло-желтая
форма клубня	удлиненно-овальная
глубина глазков	мелкие
Структура урожая	
потенциальная урожайность, т/га	63,00
количество клубней на куст, шт.	12-16
средняя масса клубня, г	100-130
Качественные характеристики	
содержание крахмала, %	12-17
вкус, балл	4,2-4,4
разваримость	слабая (тип В)
содержание белка, %	2,62-3,31
содержание витамина С, мг%	19,2-24,0
Устойчивость к жаре и засухе	средняя
Устойчивость к болезням, вредителям	
рак картофеля	устойчив
картофельная нематода	устойчив
фитофтороз	среднеустойчив
парша обыкновенная	слабо поражается
вирусные заболевания	среднеустойчив
Лёжкость при хранении	хорошая
Примечание	раннее накопление товарного урожая, выравненность клубней, привлекательный внешний вид
Включён в Госреестр РФ	2016 г., совместно с ООО «Агрофирма «КРиММ»
Регион возделывания	4,10



STI 0032FAM 68-71-77-80 (1-1-1-1)	STG 0016FAM 122-131-134 (1-1-1)	STI 001FAM 166-178-184 (1-2-1)	STI 0039ROX 87-90-96 (1-2-1)	STI 0033ROX 118-130-136 (1-1-1-1)	STM 5114ROX 302-311 (3-1)	STM 1104R6G 78-82 (1-1)	STI 004R6G 169-178 (3-1)	STM 5127R6G 249 (4)	STI 0014TAMR A 176 (4)
--	--	---	------------------------------------	--	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------------

МИШКА Н



Группа спелости	ранний
Назначение сорта	столовый
Морфологические признаки	
куст	высокий
лист	мелкий
венчик цветка	светло-фиолетовый
Клубень	
окраска кожуры	красная
окраска мякоти	белая
форма клубня	овальная
глубина глазков	мелкие
Структура урожая	
потенциальная урожайность, т/га	50,00
количество клубней на куст, шт.	10-14
средняя масса клубня, г	100-130
Качественные характеристики	
содержание крахмала, %	13,0-17,7
вкус, балл	3,9-4,6
разваримость	средняя (тип В)
содержание белка, %	3,00-3,06
содержание витамина С, мг%	26,00
Устойчивость к жаре и засухе	средняя
Устойчивость к болезням, вредителям	
рак картофеля	устойчив
картофельная нематода	устойчив
фитофтороз	среднеустойчив
парша обыкновенная	среднеустойчив
вирусные заболевания	среднеустойчив
Лежкость при хранении	хорошая
Примечание	раннее накопление товарной урожайности
Включён в Госреестр РФ	2018 г., совместно с ООО «Агро-фирма «КРИММ»; Министерство АПКП Свердловской области
Регион возделывания	4
Наличие патента	патент



STI 0032FAM 71-80-86 (1-1-2)	STG 0016FAM 131-134 (3-1)	STI 001FAM 178-190 (3-1)	STI 0030RON 93-96-108 (1-1-2)	STI 0033RON 118-130-136 (2-1-1)	STM 5114RON 293-302 (1-3)	STM 1104R6G 81-99-105 (1-1-1)	STI 004R6G 166-172 (2-2)	STM 5127R6G 249 (4)	STI 0014TAMRA 175-181 (1-3)
---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--	--	------------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------------

АЛЯСКА N

17



Группа спелости	среднеспелый
Назначение сорта	столовый
Морфологические признаки	
куст	высокий
лист	большой
венчик цветка	светло-фиолетовый
Клубень	
окраска кожуры	красная
окраска мякоти	белая
форма клубня	удлиненно-овальная
глубина глазков	мелкие
Структура урожая	
потенциальная урожайность, т/га	82,00
количество клубней на куст, шт.	12-16
средняя масса клубня, г	110-140
Качественные характеристики	
содержание крахмала, %	13,0-16,0
вкус, балл	4,0-4,5
разваримость	слабая (тип АВ)
содержание белка, %	3,00-3,52
содержание витамина С, мг%	17,8-25,4
Устойчивость к жаре и засухе	средняя
Устойчивость к болезням, вредителям	
рак картофеля	устойчив
картофельная нематода	устойчив
фитофтороз	среднеустойчив
парша обыкновенная	среднеустойчив
вирусные заболевания	среднеустойчив
Лежкость при хранении	хорошая
Примечание	сорт интенсивного типа, отличается стабильно высокой урожайностью, устойчивостью к фитофторозу
Включен в Госреестр РФ	С 2018 г. проходит государственное испытание
Регион возделывания	
Наличие патента	



STI 0032FAM 80-83 (1-3)	STG 0016FAM 122-131-134-152 (1-1-1-1)	STI 0016FAM 178 (4)	STI 0030RON 96-93-108 (2-1-1)	STI 0033RON 118-130-136 (2-1-1)	STM 0114RON 287-293-296-302 (1-1-1-1)	STM 1104R6G 81-96 (2-2)	STI 004R6G 172 (4)	STM 5127R6G 240 (4)	STI 0014TAMRA 175-181-184 (1-1-2)
----------------------------------	--	------------------------------	--	--	--	----------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--

Группа спелости	ранний
Назначение сорта	столовый
Морфологические признаки	
куст	средний
лист	крупный
венчик цветка	белый
Клубень	
окраска кожуры	жёлтая
окраска мякоти	светло-жёлтая
форма клубня	овальная
глубина глазков	мелкие
Структура урожая	
потенциальная урожайность, т/га	55,00
количество клубней на куст, шт.	10-12
средняя масса клубня, г	150-180
Качественные характеристики	
содержание крахмала, %	10,0-14,0
вкус, балл	3,9-4,2
разваримость	слабая (тип В)
содержание белка, %	3,10-3,36
содержание витамина С, мг%	22,0
Устойчивость к жаре и засухе	средняя до высокой
Устойчивость к болезням, вредителям	
рак картофеля	устойчив
картофельная нематода	устойчив
фитофтороз	среднеустойчив
парша обыкновенная	среднеустойчив
вирусные заболевания	среднеустойчив
Лёжкость при хранении	хорошая
Примечание	Раннее накопление товарной урожайности
Включён в Госреестр РФ	С 2018 г. проходит государственное испытание
Регион возделывания	
Наличие патента	

